

5 Color: CMYK, PMS: 347 C  
 USDA Product Code: 1555.R8  
 Revision#: 216643.R5  
 Carton Size: 8-1/16" W x 4-5/32"  
 Coding Space: 1-5/8" x 3/4" CCT: 031  
 Die: CSK10515A

**INDICATIONS:** This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy cats, 8 weeks of age or older, against feline leukemia virus. The duration of immunity is at least 2 years. For more information regarding efficacy and safety, visit our product data at [www.usda.gov](http://www.usda.gov).  
**INDICATIONS:** Ce produit s'est avéré efficace pour la vaccination des chats en santé âgés de 8 semaines ou plus contre le virus de la leucémie féline. La durée de l'immunité est d'au moins 2 ans. Pour plus d'information concernant les données d'efficacité et d'innocuité, visiter [www.usda.gov](http://www.usda.gov).  
 Ce produit s'est avéré efficace contre la vémie persistante chez les chats exposés au virus virulent de la leucémie féline.

Nobivac<sup>®</sup> NXT<sup>®</sup> FeLV



Nobivac<sup>®</sup> NXT<sup>®</sup>  
 FeLV

FOR ANIMAL USE ONLY  
 DESTINÉ AUX ANIMAUX SEULEMENT

25x1 Dose, 0.5 mL  

**FELINE LEUKEMIA VACCINE, RNA PARTICLE  
 VACCIN CONTRE LA LEUCÉMIE FÉLINE,  
 PARTICULE D'ARN**


In the absence of a veterinarian-client-patient relationship, federal regulations prohibit the relabeling, repackaging, resale or redistribution of the individual contents of this package.  
 La réglementation fédérale interdit le réétiquetage, le réemballage, la revente ou la redistribution du contenu de cet emballage si ce n'est dans le contexte d'une relation vétérinaire-client-patient.

Adjuvant, preservative, antibiotic and thimerosal free  
 Sans adjuvant, agent de conservation, antibiotique ou thimérosal

Intervet Inc. d/b/a Merck Animal Health  
 Omaha, NE 68103 USA/É.-U.  
 VLN 165A/PCN 1555.R8  
 Perm. vét. des É.-U. n° 165A/Code de produit n° 1555.R8  
 1 800 224-5318 (USA)  
 1 866 683-7838 (Canada)



Code 212404 216643 R5



6 2858197161 3

Ser.:  
 Ser.:  
 Exp.:  
 Fel.:

Nobivac<sup>®</sup> NXT<sup>®</sup> FeLV

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:** For primary immunization, administer 1 dose (0.5 mL) subcutaneously as early as 8 weeks of age, followed by a second dose administered 3 to 4 weeks later. See reverse side for complete directions.  
**PRECAUTIONS:** Store at 2°-8°C (35°-46°F). Do not freeze. Do not mix with other products, except as specified on this label. This product has not been tested in pregnant animals. In case of human exposure, contact a physician.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:** Pour la primovaccination, administrer 1 dose (0,5 mL) par voie sous-cutanée dès l'âge de 8 semaines, suivie d'une deuxième dose administrée 3 à 4 semaines plus tard. Voir le verso pour les instructions complètes.  
**PRÉCAUTIONS:** Conserver entre 2 et 8 °C (35 et 46 °F). Ne pas congeler. Ne pas mélanger avec d'autres produits, sauf tel que spécifié sur cette étiquette. Ce produit n'a pas été testé chez des femelles gestantes. En cas d'exposition humaine, communiquer avec un médecin.

**PRODUCT DESCRIPTION:** Nobivac® NXT FeLV is a non-adjuvanted, freeze-dried injectable feline leukemia virus vaccine, utilizing RNA particle technology. The vaccine stimulates expression of the desired antigen to induce a protective immune response against feline leukemia virus, including protection against persistent viremia in cats.

**INDICATIONS:** This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy cats 8 weeks of age or older against feline leukemia virus. Duration of immunity is at least 2 years. For more information regarding efficacy and safety data, go to [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

This product has been shown to be effective against persistent viremia in cats exposed to virulent feline leukemia virus.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:** Transfer contents of the sterile diluent vial to the Nobivac® NXT FeLV vial aseptically and mix gently until dissolved. For primary immunization, administer 1 dose (0.5 mL) subcutaneously as early as 8 weeks of age, followed by a second dose administered 3 to 4 weeks later. Contact your veterinarian or manufacturer for more information on revaccination frequency.

**PRECAUTIONS:**

- Store at 2°-8°C (35°-46°F).
- Do not freeze.
- Use new, non-chemically sterilized needles and syringes.
- Do not mix with other products, except as specified on this label.
- In case of human exposure, contact a physician.

**WARNINGS:**

- Vaccinate only healthy, non-parasitized cats.
- This product has not been tested in pregnant animals.
- Do not administer to horses or other equine species.
- The use of a biological product may produce anaphylaxis and/or other inflammatory immune-mediated hypersensitivity reactions.

**Antidote:** Epinephrine, corticosteroids, and antihistamines may all be indicated depending on the nature and severity of the reaction.

Intervet Inc. d/b/a Merck Animal Health  
Omaha, NE 68103 USA  
VLN 165A/PCN 1555.R8  
1 800 224-5318 (USA)  
1 866 683-7838 (Canada)

For patent information:  
<http://www.merck.com/product/patent/home.html>

**DESCRIPTION DU PRODUIT:** Nobivac® NXT FeLV est un vaccin injectable, lyophilisé et sans adjuvant contre le virus de la leucémie féline, utilisant la technologie de particule d'ARN. Le vaccin stimule l'expression de l'antigène souhaité pour induire une réponse immunitaire protectrice contre le virus de la leucémie féline, y compris une protection contre la virémie persistante chez le chat.

**INDICATIONS:** Ce produit s'est avéré efficace pour la vaccination des chats en santé âgés de 8 semaines ou plus contre la leucémie féline. La durée de l'immunité est d'au moins 2 ans. Pour plus d'information concernant les données d'efficacité et d'innocuité, visiter [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

Ce produit s'est avéré efficace contre la virémie persistante chez les chats exposés au virus virulent de la leucémie féline.

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:** Dans des conditions d'asepsie, transférer le contenu de la fiole de diluant stérile dans la fiole de Nobivac® NXT FeLV et mélanger doucement jusqu'à dissolution. Pour la primovaccination, administrer 1 dose (0,5 mL) par voie sous-cutanée dès l'âge de 8 semaines, suivie d'une deuxième dose administrée 3 à 4 semaines plus tard. Contactez votre vétérinaire ou le fabricant pour plus d'informations sur la fréquence de revaccination.

**PRÉCAUTIONS:**

- Conserver entre 2 et 8 °C (35 et 46 °F).
- Ne pas congeler.
- Utiliser des aiguilles et des seringues neuves, qui n'ont pas été stérilisées au moyen de produits chimiques.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits, sauf tel que spécifié sur cette étiquette.
- En cas d'exposition humaine, communiquer avec un médecin.

**MISES EN GARDE:**

- Vacciner seulement les chats en santé et exempts de parasites.
- Ce produit n'a pas été testé chez des femelles gestantes.
- Ne pas administrer aux chevaux ou à d'autres espèces d'équidés.
- L'utilisation de tout produit biologique peut provoquer des réactions anaphylactiques ou d'autres réactions inflammatoires d'hypersensibilité d'origine immunitaire.

**Antidotes:** L'épinéphrine, les corticostéroïdes et les antihistaminiques sont tous indiqués, et le choix de l'antidote dépend de la nature et de la gravité de la réaction.

Intervet Inc. s/n Merck Animal Health  
Omaha, NE 68103 É.-U.  
Perm. vét. des É.-U. n° 165A  
Code de produit n° 1555.R8  
1 800 224-5318 (É.-U.)  
1 866 683-7838 (Canada)  
Information sur les brevets:  
<http://www.merck.com/product/patent/home.html>